

# 《X-P・CT・MRI・骨密度検査のご依頼 ご予約方法》

2017年12月吉日

東戸塚記念病院  
放射線科  
地域医療連携室

## ■X-P・CT・MRI検査予約フロー（※骨密度検査の予約は必要ありません）

### 紹介元医療機関

・お電話にてお申し込みください。《☎045-825-7965（放射線科直通）》  
お問合せ時間：平日9:00～16:00 / 土曜日9:00～12:00  
※患者様やご家族からの直接の予約はお受けできません。

### ご予約

<予約事項の必要事項>  
・患者様の「氏名」「性別」「生年月日」「撮影部位」  
・検査希望日  
※当院の診察券番号がお分かりの場合は、その番号をお知らせください。

### ご予約完了後

- ①指定の「X-P・CT・MRI・骨密度測定 検査予約票」に必要事項を記入。
- ②以下書類を地域医療連携室までFAX送付をお願いします。
  - 「X-P・CT・MRI・骨密度測定 検査予約票」
  - 「造影剤同意書・問診票」（造影剤を使用される場合）⇒造影剤を使用される場合は、測定日と併せてクレアチニン値をご記入下さい。  
FAX:045-825-7970（地域医療連携室直通）
- ③患者様に患者様用控えをお渡しし、紹介先控えは封入して患者様へお渡しください。  
※造影剤使用の場合、造影剤同意書へ紹介元医療機関名の明記をお願いします。  
※造影剤使用の場合、裏面の注意事項に従いご対応をお願いします。

### 検査当日

- ・予約時刻の15分前までに、地域医療連携室へお越しください。
  - ・当日のお持ち物
    - 「X-P・CT・MRI・骨密度測定 検査予約票」
    - 「造影剤同意書・問診票」（造影剤を使用される場合）
    - 当院の診察券（既にお持ちの場合）
    - 保険証
- 上記をお持ちいただけるよう患者様へお伝えください。

### 読影結果報告

- ・検査結果については、CD-Rにて患者様へお渡します。
- ・読影結果については、紹介元医療機関へFAX・郵送にてご報告させていただきます。

※放射線科の受付電話は内線共有となっており、繋がりにくい場合がございますが、ご容赦ください。  
※緊急検査のご依頼の場合でも、放射線科受付まで直接ご連絡ください。

## 【造影CT・MRI検査時の注意点】

### ■検査予約票へ『血清クレアチニン値』と『その測定日』の記載必須（※検査日直近6カ月以内）

⇒問診票に血清クレアチニン値の記載が無い場合、当日の撮影ができない場合がございます。

予めご了承ください。

### ※以下に該当した場合、造影CT・MRI検査を中止する場合があります

- ・造影剤副作用歴がある。
- ・血清クレアチニン値が高値。
- ・造影剤問診票記載内容を受けての放射線科医判断。

⇒上記等、放射線科医が造影剤投与を行わない方が良いと判断した場合、造影検査の中止を進言させていただきます。予めご了承ください。

### ※造影CT・MRI検査を予定し、ビグアナイド系糖尿病用剤を服用中の方はご注意ください

- ・事前検査の血清クレアチニン値によっては、**検査48時間前から服用中止**いただく場合がございます。
- ・造影検査の**実施後48時間は服用中止**となります。

## ≪糖尿病用剤服用中止の詳細≫

### ビグアナイド系糖尿病用剤の服用中止について

腎機能・血清クレアチニン値	造影 CT 検査前	造影 CT 検査後
血清クレアチニン値が正常	検査時より服用中止	※検査後 48 時間、服用中止
血清クレアチニン値が異常	検査時より服用中止	※検査後 48 時間、服用中止

### ビグアナイド系糖尿病用剤一覧

一般名	商品名
メトホルミン塩酸塩	グリコラン、メデット、ネルビス、メトリオン メトグルコ、メトホルミン塩酸塩、
ブホルミン塩酸塩	ジベトス、ジベトン S 塩酸ブホルミン「ミタ」
メトホルミン塩酸塩(配合薬)	メタクト配合錠 LD/HD、 エクメット配合錠 LD/HD、イニシク配合錠

## ≪参考≫ヨード造影剤との併用注意の薬剤について

- ・ビグアナイド系糖尿病用剤とヨード造影剤の併用は、乳酸アシドーシスをきたす可能性があり注意が必要です。  
⇒ヨード造影剤の投与により一過性の腎機能低下を引き起こし、ビグアナイド系糖尿病用剤の腎排泄が減少し、血中濃度が上昇すると考えられています。
- ・薬剤の併用によって、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等や倦怠感、筋肉痛、過呼吸等が発生する恐れがあります。  
(死亡例も報告あり)
- ・その為ビグアナイド系糖尿病用剤の服薬を中止し、検査後48時間後に再開することが望ましいとされています。

安心して検査を受けていただけるよう、ヨード造影剤を使用予定の患者さまにはあらかじめ服用の中止など、適切な処置へのご協力をお願い致します。