

がん化学療法
レジメン登録申請書

申請科部長	申請受付	薬局長	化療委員長

レジメン名 FTD/TPI+BV

【申請年月日】 2025年4月2日

【申請科】 外科

【申請者名】

【適応腫瘍名】 切除不能進行再発大腸がん3次治療

【投与期間】 (投与間隔・回数)

4週1クール(2投2休)

※太線・太枠内を記入し、提出をお願いします。

	薬剤名	投与量	投与ルート	点滴時間速度	投与日程																			
					day1	day5	day6-7	day8	day12	day13-14	day15	day16-28												
Rp1.	トリフルリジン・チビラシル錠	下記参照	o.p	10日間 内服 4日間 休薬 14日間 休薬	5日間内服		2日間休薬		5日間内服		2日間休薬	14日間休薬												
Rp2.	ベバシズマブ注	7.5mg/kg 100mL			初回90分 2回目 60分 3回目以降 30分	↓					↓	休薬												
Rp3.	生理食塩水	d.i.v. 																						
Rp4.																								
Rp5.																								
Rp6.																								

【ロンサーフ投与量】 15mg製剤と20mg製剤が存在

BSA<1.07m ²	:70mg/日(35-35)
1.07m ² ≤BSA<1.23m ²	:80mg/日(40-40)
1.23m ² ≤BSA<1.38m ²	:90mg/日(45-45)
1.38m ² ≤BSA<1.53m ²	:100mg/日(50-50)
1.53m ² ≤BSA<1.69m ²	:110mg/日(55-55)
1.69m ² ≤BSA<1.84m ²	:120mg/日(60-60)
1.84m ² ≤BSA<1.99m ²	:130mg/日(65-65)
1.99m ² ≤BSA<2.15m ²	:140mg/日(70-70)
2.15m ² ≤BSA	:150mg/日(75-75)

コメント・参考文献

フッ化ピリミジン系・オキサリプラチン・イリノテカイン・抗VEGF療法および/または抗EGFR療法を含む2レジメンの治療歴のある3次療法として使用可能。

ロンサーフ®は5日間内服→2日間休薬を2週行う薬剤のため処方日数に注意!!コメント欄に記載を推奨。
(推奨:日-金内服、土日休薬)

ファーリング済	プロトコール登録	セット登録済	指導箋作成